

ESPACES VECTORIELS NORMÉS DE DIMENSION FINIE NORMES USUELLES, ÉQUIVALENCE DES NORMES

SOMMAIRE

1. Normes sur un espace vectoriel E	2
1.1. Définition d'une norme. Citer l'inégalité triangulaire renversée.	2
1.2. Normes usuelles	3
1.3. Définition des normes équivalentes.	4
Contre-exemple dans $C([0, 1], \mathbb{R})$: fonction "triangle" de base $1/n$ et de hauteur n pour $\ \cdot\ _1$ et $\ \cdot\ _\infty$.	4
2. Cas de la dimension finie	5
2.1. Théorème d'équivalence des normes	5
Contre-exemple : $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2}, a, b \in \mathbb{Q}\}$ avec $N_1(a + b\sqrt{2}) = a + b $ et $N_2(a + b\sqrt{2}) = a + b\sqrt{2} $	7
2.2. Conséquences : continuité des applications linéaires, caractérisation des compacts etc...	7
Contre-exemple : l'application linéaire $P \mapsto P'$ est non continue sur $\mathbb{R}[X]$ pour $\ \cdot\ _\infty$	9
2.3. Théorème de Riesz. E est de dimension finie ssi la boule fermée unité est compacte	9
Exemple dans $C([0, 1], \mathbb{C})$, $f_n(x) = e^{inx}$ pour $\ \cdot\ _\infty$.	11

Dans toute la leçon, E désigne un espace vectoriel sur un corps $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou \mathbb{C} . (Sauf contre-exemple particulier)

Prérequis

Entre autres prérequis élémentaires, on supposera acquis les résultats suivants :

- Tout espace vectoriel E de dimension finie (sur \mathbb{R} ou \mathbb{C}) est isomorphe à \mathbb{R}^n .
- Définition d'une application lipschitzienne d'un espace vectoriel normé dans un autre.
- Définition d'une application continue d'un espace vectoriel normé dans un autre.
- L'image réciproque d'un fermé par une application continue est un fermé.
- Une partie F de E est fermée dans E si et seulement si toute suite d'éléments de F convergeant dans E converge dans F .
- Définition d'une partie compacte X : toute suite d'éléments de X admet une valeur d'adhérence dans X .
- Un intervalle fermé borné est un compact de \mathbb{R} .
- Un produit fini de compacts est un compact.
- Dans \mathbb{R}^n les parties compactes sont les parties fermées bornées.
- Si X est une partie fermée d'un compact A , alors X est compacte.
- Toute application continue sur un compact est bornée et atteint ses bornes.

1. Normes sur un espace vectoriel E

1.1. Définition d'une norme

Définition

On appelle norme sur E toute application N de E dans \mathbb{R} telle que :

- i) $\forall x \in E, \quad N(x) = 0 \Rightarrow x = 0$ (séparation)
- ii) $\forall (x, \lambda) \in E \times \mathbb{K}, \quad N(\lambda x) = |\lambda|N(x)$ (homogénéité)
- iii) $\forall (x, y) \in E \times E, \quad N(x + y) \leq N(x) + N(y)$ (inégalité triangulaire)

Notation et vocabulaire : on note $N(x) = \|x\|_E$ ou $N(x) = \|x\|$ lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté. On appelle espace vectoriel normé, tout couple $(E, \|\cdot\|)$ où $\|\cdot\|$ est une norme sur E .

Remarques :

- D'après ii) avec $\lambda = 0$, il vient $N(0) = 0$.
- La condition $\forall x \in E, N(x) \geq 0$ serait superflue dans la définition : d'après iii) et ce qui précède on a :
$$\forall x \in E : 0 \leq N(0) \leq N(x - x) \leq N(x) + N(-x) \leq N(x) + |-1|N(x) \leq 2N(x), \text{ d'où } N(x) \geq 0$$
- Si la propriété i) (séparation), n'est pas vérifiée, on dit que N est une semi-norme.
- Contrairement aux espaces euclidiens, deux vecteurs non liés peuvent réaliser "l'égalité" triangulaire. Considérer, dans \mathbb{R}^n , $x = (1, 1, 0, \dots, 0)$ et $y = (1, 0, \dots, 0)$ avec la norme $\|x\| = \sup_{i \in \{1, \dots, n\}} |x_i|$.

On a alors $\|x\| = \|y\| = 1, \|x + y\| = 2$, donc $\|x\| + \|y\| = \|x + y\|$ et pourtant x et y ne sont pas (positivement) liés.

Une propriété utile : inégalité triangulaire renversée

$$\forall (x, y) \in E \times E \quad \left| \|x\| - \|y\| \right| \leq \|x - y\|$$

Cette propriété est importante, elle permettra d'affirmer que toute norme N est continue sur E .

(Pour démontrer la propriété, on écrit $x = (x - y) + y$ et $y = (y - x) + x$ puis on utilise l'inégalité triangulaire)

Norme sur un sous-espace vectoriel : si F est un sous-espace vectoriel de E , la restriction de N à F est évidemment une norme sur F appelée norme induite.

Distance associée à une norme :

À partir de toute norme N sur E , on peut construire une distance d par :

$$d : E \times E \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto N(x - y)$$

L'application d ainsi définie vérifie alors les 3 propriétés :
1) $\forall (x, y) \in E \times E, d(x, y) = d(y, x)$
2) $d(x, y) = 0 \Rightarrow x = y$
3) $\forall (x, y, z) \in E^3, d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$
Ce qui en fait bien une distance.

Ainsi tout espace vectoriel normé est un espace métrique et la norme N engendre une topologie sur E .

Noter qu'il existe des distances ne découlant pas d'une norme, comme par exemple, la distance discrète :

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = y \\ 1 & \text{si } x \neq y \end{cases}$$

En effet, l'application N obtenue en posant $N(x) = d(x, 0)$ ne vérifie pas l'axiome d'homogénéité.

1.2. Normes usuelles

On montre que les applications ci-dessous sont des normes :

i) $E = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C} : x \mapsto |x|$

ii) $E = \mathbb{R}^n$ ou $\mathbb{C}^n, x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, p \in]0; +\infty[: x \mapsto \|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}$ (surtout pour $p = 1$ ou 2)

iii) $E = \mathbb{R}^n$ ou $\mathbb{C}^n, x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x \mapsto \|x\|_\infty = \sup_{i \in \{1, \dots, n\}} |x_i|$.

iv) Norme d'une application linéaire continue $u \in \mathcal{L}(E, F)$ où $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ sont deux espaces vectoriels normés de dimension finie :

$$u \mapsto \|u\| = \sup_{x \in \bar{B}(0,1)} \|u(x)\|_F \text{ où } \bar{B}(0,1) \text{ désigne la boule fermée unité : } \bar{B}(0,1) = \{x \in E \text{ tels que } \|x\|_E \leq 1\}$$

Note : une application linéaire $u \in \mathcal{L}(E, F)$ est continue sur E si et seulement si :

$$\exists M \in \mathbb{R} \text{ tel que } \forall x \in E : \|u(x)\|_F \leq M \|u(x)\|_E.$$

v) $E = \mathbb{R}_n[X], P = \sum_{i=0}^n a_i X^i \in \mathbb{R}_n[X] : P \mapsto \|P\| = \sup_{i \in \{0, \dots, n\}} |a_i|$.

Preuve :

i) Évident

ii) Toutes les conditions de la définition se démontrent aisément sauf l'inégalité triangulaire, qui est l'inégalité de Minkowski qui se démontre de façon technique à l'aide de la convexité (non triviale) de la fonction homogène

$$\text{suivante : } x \mapsto \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p} \text{ (voir leçon sur la convexité)}$$

iii) Inégalité triangulaire pour $\|\cdot\|_\infty$. Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^n$ de coordonnées $x = (x_1, \dots, x_n)$ et $y = (y_1, \dots, y_n)$.

On a (inégalité triangulaire classique sur \mathbb{R}) :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, |x_i + y_i| \leq |x_i| + |y_i| \leq \sup_{i \in \{1, \dots, n\}} |x_i| + \sup_{i \in \{1, \dots, n\}} |y_i|$$

En particulier, pour l'indice i tel que $|x_i + y_i|$ soit maximal :

$$\sup_{i \in \{1, \dots, n\}} |x_i + y_i| \leq \sup_{i \in \{1, \dots, n\}} |x_i| + \sup_{i \in \{1, \dots, n\}} |y_i|.$$

D'où :

$$\|x + y\|_\infty \leq \|x\|_\infty + \|y\|_\infty.$$

iv) Inégalité triangulaire pour $\|\cdot\|$ sur $\mathcal{L}(E, F)$. Soient $u, v \in \mathcal{L}(E, F)$.

Comme $\|\cdot\|_F$ est une norme sur F , on a :

$$\forall x \in E, \|(u+v)(x)\|_F \leq \|u(x)\|_F + \|v(x)\|_F$$

En particulier :

$$\forall x \in \bar{B}(0,1), \|(u+v)(x)\|_F \leq \|u(x)\|_F + \|v(x)\|_F \leq \sup_{x \in \bar{B}(0,1)} \|u(x)\|_F + \sup_{x \in \bar{B}(0,1)} \|v(x)\|_F$$

Et en passant à la borne supérieure pour $x \in \bar{B}(0,1)$, il vient :

$$\sup_{x \in \bar{B}(0,1)} \|(u+v)(x)\|_F \leq \sup_{x \in \bar{B}(0,1)} \|u(x)\|_F + \sup_{x \in \bar{B}(0,1)} \|v(x)\|_F$$

D'où :

$$\|u+v\| \leq \|u\| + \|v\|$$

v) Inégalité triangulaire pour $\| \cdot \|$ sur $\mathbb{R}_n[X]$.

$$\text{Soient } P, Q \in \mathbb{R}_n[X], P = \sum_{i=0}^n a_i X^i \text{ et } Q = \sum_{i=0}^n b_i X^i$$

On a (inégalité triangulaire classique sur \mathbb{R}) :

$$\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, |a_i + b_i| \leq |a_i| + |b_i| \leq \sup_{i \in \{0, \dots, n\}} |a_i| + \sup_{i \in \{0, \dots, n\}} |b_i|$$

En particulier, pour l'indice i tel que $|a_i + b_i|$ soit maximal :

$$\sup_{i \in \{0, \dots, n\}} |a_i + b_i| \leq \sup_{i \in \{0, \dots, n\}} |a_i| + \sup_{i \in \{0, \dots, n\}} |b_i|.$$

D'où :
$$\|P + Q\| \leq \|P\| + \|Q\|.$$

1.3. Normes équivalentes

Définition

Deux normes N_1 et N_2 sur E sont dites équivalentes si :

$$\exists (\lambda, \mu) \in (\mathbb{R}_+^*)^2 \text{ tels que : } \forall x \in E, \lambda N_1(x) \leq N_2(x) \leq \mu N_1(x)$$

On note alors $N_1 \sim N_2$ sur E . La relation ainsi définie est bien une relation d'équivalence :

- On a $N_1 \sim N_1$ en choisissant $\lambda = \mu = 1$ d'où la réflexivité.
- Si $\lambda N_1(x) \leq N_2(x) \leq \mu N_1(x)$ alors $\frac{1}{\mu} N_2(x) \leq N_1(x) \leq \frac{1}{\lambda} N_2(x)$ d'où la symétrie.
- Si $\lambda N_1(x) \leq N_2(x) \leq \mu N_1(x)$ et $\lambda' N_2(x) \leq N_3(x) \leq \mu' N_2(x)$ alors $\lambda \lambda' N_1(x) \leq N_3(x) \leq \mu \mu' N_1(x)$

D'où la transitivité.

Remarques :

- deux normes N_1 et N_2 sur E sont équivalentes si et seulement si l'application $Id : (E, N_1) \rightarrow (E, N_2)$ est bicontinue (ou encore "si l'identité est un homéomorphisme")
- deux normes N_1 et N_2 sont non équivalentes si et seulement si il existe une suite (x_n) d'éléments de E telle que la suite $\left(\frac{N_2(x_n)}{N_1(x_n)} \right)$ ne soit pas bornée.

Exemple : sur \mathbb{R}^n , les normes $\| \cdot \|_1$, $\| \cdot \|_2$ et $\| \cdot \|_\infty$ sont équivalentes.


En effet on montre sans difficultés que :

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_\infty \text{ et } \|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n} \|x\|_\infty$$

Contre-exemple : sur $E = C([0 ; 1], \mathbb{R})$, on considère les normes $\| \cdot \|_1$ et $\| \cdot \|_\infty$ définies par :

$$\|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)| dt \quad \text{et} \quad \|f\|_\infty = \sup_{t \in [0 ; 1]} |f(t)|$$

On considère la suite (f_n) d'éléments de E définie par : $f_n(x) = \begin{cases} -n^2x + n & \text{si } x \in \left[0 ; \frac{1}{n}\right] \\ 0 & \text{si } x \in \left[\frac{1}{n} ; 1\right] \end{cases}$.



On a : $\|f_n\|_\infty = \sup_{t \in [0;1]} |f_n(t)| = n$ et $\|f_n\|_1 = \int_0^1 |f_n(t)| dt = \frac{1}{2}$

D'où : $\frac{\|f_n\|_\infty}{\|f_n\|_1} = 2n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$.

Donc il n'existe pas de réel M tel que : $\forall n \in \mathbb{N}, \|f_n\|_\infty \leq M \|f_n\|_1$

Donc les normes $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$ ne sont pas équivalentes.

2. Cas de la dimension finie.

Dans tout ce paragraphe, E désigne un espace vectoriel normé sur \mathbb{K} ($= \mathbb{R}$ ou \mathbb{C}).

2.1. Équivalence des normes

L'intérêt du théorème suivant est que, en dimension finie, on n'aura plus à préciser quelle est la norme utilisée dans les diverses propriétés topologiques (telles que la continuité ou la compacité).

Théorème

Soit E un e.v.n. **sur \mathbb{R} ou \mathbb{C}** .

Si E est dimension finie, alors toutes les normes sur E sont équivalentes.

Attention !
Ce théorème est faux si le corps de base n'est pas complet !

Soit (e_1, \dots, e_n) une base de E et N une norme quelconque sur E . Munissons E de la norme $\|\cdot\|_\infty$:

Rappelons que pour $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, on a : $\|x\|_\infty = \sup_{i \in \{1, \dots, n\}} |x_i|$.

Lemme

Si E est de dimension finie, alors toute norme N est une application **continue** de $(E, \|\cdot\|_\infty)$ dans $(\mathbb{R}, |\cdot|)$.

Preuve du lemme :

Nous allons montrer que l'application N est lipschitzienne.

Soit $x \in E$, on a : $N(x) = N\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i\right)$

D'après l'inégalité triangulaire et l'homogénéité de la norme N , on a :

$$N\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i\right) \leq \sum_{i=1}^n |x_i| N(e_i) \leq \sum_{i=1}^n N(e_i) \|x\|_\infty.$$

Posons $M = \sum_{i=1}^n N(e_i)$. ($M > 0$ car, les e_i étant non nuls, on a $N(e_i) \neq 0$).

D'où : $N(x) \leq M \|x\|_\infty$.

On peut donc écrire : $\exists M > 0$ tel que : $\forall (x, y) \in E^2, N(x - y) \leq M \|x - y\|_\infty$.

Or, d'après l'inégalité triangulaire renversée :

$$|N(x) - N(y)| \leq N(x - y).$$

On peut donc écrire : $\exists M > 0$ tel que : $\forall (x, y) \in E^2, |N(x) - N(y)| \leq M \|x - y\|_\infty$.

Ce qui signifie que l'application $N : (E, \|\cdot\|_\infty) \rightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$ est M -lipschitzienne donc continue (sur E).

Démonstration du théorème :

Déjà, comme tout espace vectoriel E de dimension finie est isomorphe à \mathbb{R}^n , il suffit de démontrer le théorème dans le cas où $E = \mathbb{R}^n$.

On va montrer que N est équivalente à $\|\cdot\|_\infty$. Considérons la sphère unité S pour $\|\cdot\|_\infty$:

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n \text{ tels que } \|x\|_\infty = 1\} = \{x \in \mathbb{R}^n \text{ tels que } \sup_{i \in \{1, \dots, n\}} |x_i| = 1\} \subset \prod_{i=1}^n [-1; 1]$$

- L'ensemble $P = \prod_{i=1}^n [-1; 1]$ est un compact de \mathbb{R}^n : en effet, l'intervalle $[-1; 1]$ est un compact de \mathbb{R} . De

plus, un produit fini d'espaces compacts est compact donc $P = \prod_{i=1}^n [-1; 1]$ est un compact \mathbb{R}^n .

- S est bornée dans \mathbb{R}^n (puisque contenue dans la boule fermée unité pour $\|\cdot\|_\infty$)
- S est fermée dans \mathbb{R}^n : en effet, l'application $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \|x\|_\infty$ est continue (d'après le lemme) donc l'image réciproque d'un fermé est un fermé. Or, $S = f^{-1}(\{1\})$ et le singleton $\{1\}$ est un fermé de $(\mathbb{R}, |\cdot|)$, donc S est fermée dans \mathbb{R}^n .

Bilan : S est fermée et contenue dans le compact P donc S est compacte dans \mathbb{R}^n .

On sait que N est continue sur \mathbb{R}^n donc N est continue sur le compact S .

Donc l'application N est bornée et atteint ses bornes sur S :

$$\exists (m, M) \in (\mathbb{R}_+)^2 \text{ tels que } \forall x \in S : m \leq N(x) \leq M.$$

Mais N atteint ses bornes, donc pour un certain $x_0 \in S : N(x_0) = m$.

Or, $x_0 \neq 0$ (car $x_0 \in S$) donc $N(x_0) \neq 0$ et $m > 0$.

Donc :
$$\exists (m, M) \in (\mathbb{R}_+^*)^2 \text{ tels que } \forall x \in S : m \leq N(x) \leq M.$$

Il ne reste plus qu'à étendre le résultat ci-dessus à \mathbb{R}^n :

Soit $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Posons $x' = \frac{x}{\|x\|_\infty}$.

Il est clair qu'ainsi $x' \in S$ donc on a :
$$m \leq N(x') \leq M$$

Or,
$$N(x') = N\left(\frac{x}{\|x\|_\infty}\right) = \frac{1}{\|x\|_\infty} N(x)$$

D'où :
$$m\|x\|_\infty \leq N(x) \leq M\|x\|_\infty.$$

Enfin, cette double inégalité est toujours vraie si $x = 0$.

On a donc démontré que N et $\|\cdot\|_\infty$ sont équivalentes sur \mathbb{R}^n . Donc, par transitivité, toutes les normes sont équivalentes sur \mathbb{R}^n .

Contre-exemple : normes non équivalentes en dimension finie.

On considère : $E = \mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$

On vérifie facilement que E est un \mathbb{Q} -espace vectoriel de dimension 2. (E est sous-ensemble non vide de \mathbb{R}^2 , ses éléments sont "stables" par addition et par multiplication par un rationnel, ce qui justifie que E un e.v. (en tant que s.e.v. de \mathbb{R}^2). Enfin, on montre que E est isomorphe à \mathbb{Q}^2 (considérer l'application $\varphi : \mathbb{Q}^2 \rightarrow E, (a, b) \mapsto a + b\sqrt{2}$. φ est clairement surjective. De plus, φ est injective car $\sqrt{2}$ est irrationnel). On a donc $\dim_{\mathbb{Q}} E = 2$)

On considère, sur E , les deux applications suivantes :

$$N_1 : E \rightarrow \mathbb{R} \qquad \text{et} \qquad N_2 : E \rightarrow \mathbb{R}$$
$$a + b\sqrt{2} \mapsto |a| + |b| \qquad \qquad \qquad a + b\sqrt{2} \mapsto |a + b\sqrt{2}|$$

Vérifions que ce sont des normes :

Séparation :

$$N_1(a + b\sqrt{2}) = 0 \Rightarrow |a| + |b| = 0 \Rightarrow a = b = 0$$
$$N_2(a + b\sqrt{2}) = 0 \Rightarrow |a + b\sqrt{2}| = 0 \xrightarrow{\sqrt{2} \text{ irrationnel}} a = b = 0$$

Homogénéité :

$$\forall \lambda \in \mathbb{Q}, \quad N_1(\lambda(a + b\sqrt{2})) = N_1(\lambda a + \lambda b\sqrt{2}) = |\lambda a| + |\lambda b| = |\lambda| N_1(a + b\sqrt{2})$$
$$N_2(\lambda(a + b\sqrt{2})) = |\lambda(a + b\sqrt{2})| = |\lambda| N_2(a + b\sqrt{2})$$

Inégalité triangulaire :

$$N_1(a + b\sqrt{2} + a' + b'\sqrt{2}) \leq |a + a'| + |b + b'| \leq |a| + |a'| + |b| + |b'| \leq N_1(a + b\sqrt{2}) + N_1(a' + b'\sqrt{2})$$
$$N_2(a + b\sqrt{2} + a' + b'\sqrt{2}) \leq |a + a' + b\sqrt{2} + b'\sqrt{2}| \leq |a + b\sqrt{2}| + |a' + b'\sqrt{2}| \leq N_2(a + b\sqrt{2}) + N_2(a' + b'\sqrt{2})$$

Donc N_1 et N_2 sont bien des normes sur E .

Montrons que N_1 et N_2 ne sont pas équivalentes :

Il suffit de considérer la suite $u_n = (1 - \sqrt{2})^n = a_n - b_n\sqrt{2}$

On a : $N_1(u_n) = |a_n| + |b_n| = N_1(a_n + b_n\sqrt{2}) = |1 + \sqrt{2}|^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$ car $1 + \sqrt{2} > 1$

$$N_2(u_n) = |1 - \sqrt{2}|^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \text{ car } |1 - \sqrt{2}| \in]-1, 1[$$

La suite $\left(\frac{N_2(u_n)}{N_1(u_n)}\right)$ n'est pas bornée. Donc les normes N_1 et N_2 ne sont pas équivalentes.

2.2. Quelques conséquences du théorème :

Proposition

Si E est dimension finie, on a :

- 1) Soit F un espace vectoriel normé de dimension finie sur le même corps \mathbb{K} que E . Alors :
$$\text{toute application linéaire } f \text{ de } E \text{ dans } F \text{ est continue.}$$
- 2) Une partie X de E est compacte si et seulement si X est fermée bornée.
- 3) E est complet (toute suite de Cauchy d'éléments de E converge dans E)
- 4) Tout sous-espace vectoriel F de E est fermé.

Preuve :

1) Soit (e_i) une base de E . Munissons E et F de leur $\| \cdot \|_1$ respective. On a :

$$f \text{ étant linéaire : } \quad \forall x \in E : \|f(x)\|_1 = \left\| f \left(\sum_{i=1}^n x_i e_i \right) \right\|_1 = \left\| \sum_{i=1}^n x_i f(e_i) \right\|_1$$

$$\text{D'après l'inégalité triangulaire : } \quad \left\| \sum_{i=1}^n x_i f(e_i) \right\|_1 \leq \sum_{i=1}^n |x_i| \|f(e_i)\|_1$$

$$\text{Et en posant } M = \sup_{i \in \{1, \dots, n\}} \{\|f(e_i)\|_1\}, \text{ il vient : } \sum_{i=1}^n |x_i| \|f(e_i)\|_1 \leq M \sum_{i=1}^n |x_i|$$

$$\text{D'où finalement : } \quad \forall x \in E, \|f(x)\|_1 \leq M \|x\|_1.$$

$$\text{D'où : } \quad \forall (x, y) \in E^2 : \|f(x-y)\|_1 \leq M \|x-y\|_1$$

$$\text{Et comme } f \text{ est linéaire : } \quad \forall (x, y) \in E^2 : \|f(x) - f(y)\|_1 \leq M \|x-y\|_1$$

Donc f est M -lipschitzienne sur E donc continue sur E relativement à $\| \cdot \|_1$ donc relativement à toute norme d'après le théorème.

2) Supposons X compacte dans E .

Montrons que X est fermée :

Soit (x_n) une suite d'éléments de E convergeant vers $y \in E$. Comme X est compacte, la suite (x_n) admet une valeur d'adhérence $\ell \in X$. Mais comme (x_n) converge, $\ell = y$, donc $y \in X$. D'où X est fermée.

Montrons que X est bornée.

Si X n'était pas bornée, on aurait : (quelque soit la norme choisie)

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists x \in X \text{ tel que } \|x\| \geq A$$

En particulier, on peut construire une suite (x_n) d'éléments de X telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \|x_n\| \geq n$$

Un telle suite n'admet pas de valeur d'adhérence, ce qui contredirait le fait que X est compacte.

Donc X est bornée.

Réciproquement, supposons X fermée bornée dans E .

Soit ϕ une application linéaire bijective de E dans \mathbb{R}^n . Comme ϕ est une application linéaire, elle est continue (d'après 1)) donc $\phi(X)$ est compacte dans \mathbb{R}^n donc fermée bornée. Comme ϕ^{-1} est également continue, on en déduit que X est fermée bornée dans E .

3) Soit (u_n) une suite de Cauchy dans E . Comme (u_n) est bornée, il existe un réel $r > 0$ tel que la boule fermée $\bar{B}(0, r)$ contienne $\{u_n, n \in \mathbb{N}\}$. Or, $\bar{B}(0, r)$ est compacte (puisque fermée bornée). Donc toute suite de $\bar{B}(0, r)$ admet une valeur d'adhérence. Or, toute suite de Cauchy qui admet une valeur d'adhérence converge. Donc (u_n) converge, et comme $\bar{B}(0, r)$ est fermée, (u_n) converge dans $\bar{B}(0, r)$ donc dans E . Donc E est complet.

Remarque : un espace vectoriel normé de dimension finie (donc complet) s'appelle un espace de Banach.

4) Comme F est dimension finie, il est complet (d'après 3)). Montrons qu'alors F est fermé :

Soit (x_n) une suite d'éléments de F convergeant vers un élément ℓ de E . Puisque (x_n) converge, elle est de Cauchy et comme F est complet, (x_n) converge dans F , donc $\ell \in F$ et par suite F est fermé.

Contre-exemple : il existe, en dimension infinie, des **applications linéaires non continues**.

Considérons l'espace vectoriel $E = \mathbb{R}[X]$ (qui est de dimension infinie) muni de la norme $\| \cdot \|_\infty$ et l'application linéaire de dérivation φ :

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{R}[X] &\rightarrow \mathbb{R}[X] \\ P &\mapsto P' \end{aligned}$$

Considérons la suite (P_n) définie sur \mathbb{N}^* , par :

$$P_n = \frac{1}{n} X^n$$

On a, d'une part :

$$\|P_n\|_\infty = \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Et d'autre part :

$$\|\varphi(P_n)\|_\infty = \|X^{n-1}\|_\infty = 1$$

Ainsi, la suite (P_n) converge vers 0 pour la norme $\| \cdot \|_\infty$ tandis que la suite $(\varphi(P_n))$ ne converge pas vers 0.

On en déduit que φ n'est pas continue en 0. (Et comme φ est linéaire, φ n'est continue en aucun point de E)

Intuitivement, que montre ce contre-exemple ?
On sait que la dérivée du polynôme nul, c'est le polynôme nul. Or, il existe des polynômes très "proches" du polynôme nul (pour la norme $\| \cdot \|_\infty$) dont la dérivée n'est pas "proche" du polynôme nul. L'opération de dérivation n'est donc pas continue pour la norme $\| \cdot \|_\infty$.

2.3. Caractérisation de la dimension finie par une propriété topologique

Théorème de Riesz

Soit (E, N) un espace vectoriel normé. Alors :

$$E \text{ est de dimension finie} \Leftrightarrow \text{La boule fermée unité } \bar{B}(0, 1) \text{ est compacte}$$

Démonstration :

Preuve de " \Rightarrow " :

Supposons E de dimension finie.

Comme la boule fermée $\bar{B}(0, 1)$ est **fermée** (image réciproque du fermé $[0, 1]$ par l'application norme qui est continue, puisque E est de dimension finie) et **bornée** (clair) donc elle est compacte.

Preuve de " \Leftarrow " :

Lemme 1

Soit (E, N) un espace normé.

Soit F un sous-espace vectoriel de E , de dimension finie.

On note d la distance induite par N .

Alors :

$$\forall a \in E, \exists b \in F, N(a - b) = d(a, F)$$

Démonstration du lemme 1 :

Comme F est de dimension finie, F est fermé dans E .

Soit $a \in E$.

Si $a \in F$, on choisit $b = a$.

Si $a \notin F$, alors F étant fermé, $a \notin \bar{F}$. Donc : $d(a, F) > 0$

D'après les propriétés de la borne inférieure, il existe une suite (b_n)

d'éléments de F telle que $N(a - b_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} d(a, F)$:

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, (n \geq n_0 \Rightarrow |N(a - b_n) - d(a, F)| \leq \varepsilon)$$


En particulier avec $\varepsilon = 1$:

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, (n \geq n_0 \Rightarrow N(a - b_n) \leq 1 + d(a, F))$$

On rappelle que :

$$d(a, F) = \inf_{x \in F} \{N(a - x)\}$$

(Cette borne inférieure existe bien car l'application $f_a : F \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto N(a - x)$ est continue car F est de dimension finie)



Mais d'après l'inégalité triangulaire renversée :

$$|N(a) - N(b_n)| \leq N(a - b_n)$$

D'où : $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, (n \geq n_0 \Rightarrow |N(b_n) - N(a)| \leq 1 + d(a, F) \Rightarrow 0 \leq N(b_n) \leq N(a) + 1 + d(a, F))$

La suite (b_n) est donc bornée dans un espace de dimension finie. D'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, on peut en extraire une sous-suite $(b_{\sigma(n)})$ convergeant vers un certain élément b .

Et comme F est fermé, $b \in F$.

On a vu que :

$$N(a - b_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} d(a, F)$$

Donc, on a également :

$$N(a - b_{\sigma(n)}) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} d(a, F)$$

Et par continuité de N :

$$N(a - b) = d(a, F)$$

Lemme 2

Soit (E, N) un espace normé de dimension infinie

Soit F un sous-espace vectoriel de E , de dimension finie.

On note d la distance induite par N .

Alors :

$$\exists x \in \overline{B}(0, 1), d(x, F) = 1$$

Démonstration :

Soit $a \in E \setminus F$.

D'après le lemme 1 :

$$\exists b \in F, N(a - b) = d(a, F)$$

Comme $a \in E \setminus F$, $d(a, F)$ est non nul. Posons :

$$x = \frac{a - b}{N(a - b)}$$

Il est clair que $x \in \overline{B}(0, 1)$.

D'une part, comme $0 \in F$, on a :

$$d(x, F) \leq d(x, 0) \leq N(x) \leq 1 \tag{1}$$

D'autre part, pour tout $y \in F$, on peut écrire :

$$x - y = \frac{a - v}{N(a - b)} \quad \text{où } v = b + N(a - b)y \in F$$

Ainsi :

$$N(x - y) = \frac{N(a - v)}{N(a - b)} = \frac{d(a, v)}{d(a, F)} \geq 1 \quad \text{car } v \in F$$

Par passage à la borne inférieure, on obtient :

$$d(x, F) \geq 1 \tag{2}$$

D'après (1) et (2), on déduit :

$$d(x, F) = 1$$

Ce qui prouve le lemme 2.

Venons-en maintenant à la démonstration de l'implication " \Leftarrow ". Raisonnons par contraposition.

Supposons E de dimension infinie.

Soit $e_1 \in \overline{B}(0, 1)$. On pose $F_1 = \text{Vect}(e_1)$.

Alors, il existe $e_2 \in \overline{B}(0, 1)$ tel que $d(e_2, F_1) = 1$. Puis, on pose $F_2 = \text{Vect}(e_1, e_2)$.

Alors, il existe $e_3 \in \overline{B}(0, 1)$ tel que $d(e_3, F_2) = 1$. Puis, on pose $F_3 = \text{Vect}(e_1, e_2, e_3)$.

Et ainsi de suite.

Comme E est de dimension infinie, on construit ainsi une suite infinie (e_n) telle que :

$$\forall (i, j), (i \neq j \Rightarrow N(e_i - e_j) \geq 1)$$

Il sera donc impossible d'en extraire une sous-suite convergente.

Donc $\overline{B}(0, 1)$ n'est pas compacte.

On conclut par contraposition.

On dispose donc d'un "critère" pour savoir si un espace vectoriel normé est de dimension infinie :

Exemple : $E = C([0, 2\pi], \mathbb{C})$ muni de la norme de la convergence uniforme :

$$\forall f \in E, \|f\|_\infty = \sup_{x \in [0, 2\pi]} |f(x)|$$

On considère la suite (f_n) de fonctions de E définies par $f_n(x) = e^{inx}$.

On a $|f_n| = 1$, donc les f_n sont éléments de $\overline{B}(0, 1)$.

Or $\|f_n - f_p\|_\infty = \sup_{x \in [0, 2\pi]} |e^{inx} - e^{ipx}| = 2$ car :

$$e^{inx} - e^{ipx} = e^{i\left(\frac{n+p}{2}\right)x} \left[e^{i\left(\frac{n-p}{2}\right)x} - e^{-i\left(\frac{n-p}{2}\right)x} \right] = 2 \cos\left[\left(\frac{n-p}{2}\right)x\right] e^{i\left(\frac{n+p}{2}\right)x}$$

Donc $|e^{inx} - e^{ipx}| = 2 \cos\left[\left(\frac{n-p}{2}\right)x\right]$ et, (particulariser $x = 0$), $\sup_{x \in [0, 2\pi]} |e^{inx} - e^{ipx}| = 2$.

Comme on a $\|f_n - f_p\|_\infty = 2$, il est impossible d'extraire une sous-suite de (f_n) qui converge pour $\|\cdot\|_\infty$, donc $\overline{B}(0, 1)$ n'est pas compacte et E est de dimension infinie.